

# Luego de vacunarse contra la COVID-19

Versión 2.0 29 de marzo de 2021

## ¿Qué debo esperar en los próximos días?

- Estos son algunos de los efectos secundarios comunes: dolor, enrojecimiento, hinchazón en el lugar donde recibió la vacuna, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor articular, y fiebre baja.
- Los efectos secundarios graves son poco frecuentes. Llame a su médico o enfermero, o concurra al departamento de emergencias más cercano si tiene alguna de las siguientes reacciones adversas dentro de los tres días posteriores a la vacunación: urticaria, hinchazón del rostro o de la boca, problemas para respirar, piel muy pálida y somnolencia excesiva, fiebre alta (más de 40 °C), convulsiones o crisis epilépticas, o cualquier otro síntoma grave (p. ej., sensación de agujas o alfileres hincando, o insensibilidad).
- Se asocia a la vacuna AstraZeneca/COVISHIELD con un efecto secundario muy poco frecuente conocido como trombocitopenia protrombótica inmune inducida por vacunación (Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia, VIPIT). Si desarrolla alguno de los siguientes síntomas luego de recibir la vacuna, busque atención médica de inmediato: falta de aire, dolor en el pecho, hinchazón o sensación de frío en la pierna, dolor abdominal persistente, dolores de cabeza fuertes o que empeoran, visión borrosa o múltiples hematomas pequeños, manchas rojas o moradas, o ampollas de sangre en la piel.

## ¿Debo continuar con las medidas de prevención de la COVID-19?

- La vacuna es una forma adicional de protegerse de la COVID-19. Luego de recibir cualquier vacuna contra la COVID-19, debe seguir tomando las medidas de prevención de la COVID-19, como usar un tapabocas, mantener el distanciamiento social y lavarse las manos.
- Controle si tiene síntomas de COVID-19 y, de tenerlos, hágase una prueba de detección.

## ¿Cuándo se aplica la segunda dosis?

- Se necesitan dos dosis para estar completamente protegido. Si esta es su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, asegúrese de aplicarse la segunda dosis como lo indica la clínica o el sistema de reservas. Traiga el recibo impreso de la vacuna que se aplicó hoy en su segunda cita.