

กระทรวงสาธารณสุข

## หลังจากคุณฉีดวัคซีน COVID-19

เวอร์ชัน 2.0 วันที่ 29 มีนาคม 2021

### ฉันควรคาดหวังอะไรบ้างในอีกไม่กี่วันข้างหน้า?

- ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ อาการปวด, การอักเสบ, บวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน, ความเหนื่อยล้า, ปวดศีรษะ, ปวดกล้ามเนื้อ, หนาวสั่น, อาการปวดข้อและมีไข้ต่ำ
- ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงนั้นแทบจะไม่มี  
โทรหาแพทย์หรือพยาบาลของคุณหรือไปที่แผนกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดหากคุณมีอาการที่ไม่พึงประสงค์ต่อไปนี้เกิดขึ้นภายในสามวันหลังจากได้รับวัคซีน: ลมพิษ, บวมใบหน้าหรือปากของคุณ, หายใจลำบาก, หน้าซีดมากและง่วงนอนอย่างมาก, มีไข้สูง (มากกว่า 40 °C), ชักกระตุกหรือมีอาการชักหรือมีอาการร้ายแรงอื่น ๆ (เช่น "อาการเหน็บชา" หรือมีนงง)
- วัคซีน AstraZeneca/Covishield แทบจะไม่มีเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงที่เรียกว่าวัคซีน-เหนียวนำไปให้เกิดภูมิคุ้มกันล้มเหลวจุดตัน (VIPIT) หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนโปรดไปพบแพทย์ทันที: หายใจถี่, เจ็บปวดที่หน้าอก, เกิดอาการบวม, ปวดท้องแบบถาวร, ปวดหัวอย่างรุนแรงหรือแสบหรือมีตาพร่ามัว, มีรอยฟกช้ำ, มีจุดสีแดงหรือสีม่วงหรือแผลพุพองได้ผิวหนัง

### ฉันยังต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับ COVID-19 หรือไม่?

- วัคซีนเป็นวิธีเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งในการป้องกันตัวเองจาก COVID-19 หลังจากได้รับวัคซีน COVID-19 แล้วคุณควรปฏิบัติตามมาตรการ COVID-19 ต่อไป เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และล้างมือ
- ตรวจสอบอาการของ COVID-19 และรับการตรวจหากมีอาการ

### ฉันควรจะมาฉีดวัคซีนครั้งที่สองเมื่อใด?

- คุณต้องฉีดวัคซีนสองเข็มเพื่อให้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสมบูรณ์ หากนี่เป็นวัคซีน COVID-19 เข็มแรกของคุณโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการฉีดเข็มที่สองของคุณตามที่บ่งบอกโดยคลินิกหรือระบบการจองในวันนัดหมายครั้งที่สอง โปรดนำไปเสร็จวัคซีนที่คุณได้รับในวันนี้มาด้วย